

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS PACIENTES INCLUIDOS EN EL 1° REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES CON ENFERMEDAD PSORIÁSICA (ReNaEPso)




“DATOS DE LA VIDA REAL”

Subinvestigadores: Kreimer J, Savio V, Echeverría C, Luna P, Cosentino V, Mata D, Exeni I, Severina MA, Machado Escobar M, Gordillo F, Capelli L, Cosatti M, Alonso C, Martínez Muñoz A, Pérez Cepas B, Matellán C, Costa C, Gentiletti J, Dieguez C, Vila D, Dapeña J, Malvido K, Carlevaris L, Castellanos Posse ML, Cerda O, Kaplan D, Gálvez Elkin MS, Kluwak G, Eimer L, Troyano Z, Perrotat L, Lalloppizzo C, Saurit V, Barrouille J, Sanchez G, Serv. Reumatología Htal Córdoba, Serv. Dermatología Htal. Argerich.

Coordinadoras: Verónica Savio, Osvaldo Cerda, Cristina Echeverría y Jennifer Kreimer

Contacto: renaepso@soarpsso.org



**Primer registro nacional
y latinoamericano que se
desarrolla en forma
conjunta entre
dermatólogos y
reumatólogos,
promoviendo el trabajo
interdisciplinario
colaborativo.**



ReNaEPso

OBJETIVO GENERAL

- Describir las características sociodemográficas, clínicas, tratamiento y comorbilidades de pacientes con EP en ARGENTINA.
- Forma basal y la evolución durante 5 años.

EP: enfermedad psoriásica APs: artritis psoriásica PS: psoriasis

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir y analizar las características clínicas y demográficas de la EP en Argentina.
- Evaluar el impacto del trabajo interdisciplinario entre dermatólogos y reumatólogos en la EP a través de la derivación temprana y tratamiento precoz de la APs.
- Conocer la morbimortalidad anual y global a 5 años y predictores.
- Generar con una base de datos federal impulsada por la Sociedad SAR y SOARPSO, disponible para el desarrollo de estudios de investigación.

DISEÑO

Estudio de cohorte longitudinal y multicéntrico de pacientes con EP, con visitas de seguimiento semestrales durante el primer año y posteriormente anual por al menos 5 años.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Pacientes \geq de 18 años con diagnóstico de EP.


CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Pacientes \geq de 18 años con diagnóstico de PS y/o APs (cumpliendo criterios CASPAR)
- Firma del consentimiento informado

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Antecedentes de PS inducida por medicamentos.
- Diagnóstico de otras patologías inflamatorias articulares


ReNaEPso: esquema de visitas




Variables - Visita Basal

N 111

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS



Porcentaje de provincias participantes de ReNaEPso



HOSPITAL/SANATORIO/CLÍNICA: 55.1%
 AMBULATORIA: 32,7%

- LUGAR

REUMATOLOGÍA 49,5%
 DERMATOLOGÍA 28,9%

- PROFESIONAL

SI 19,4% - PASE 17,3% - EARP 2,04% - TOPAS, PEST 0%

- CUESTIONARIOS DETECCIÓN APS EN PACIENTES CON PSORIASIS



ACTUAL
10,5%
EX 35,8%

TABAQUISMO



7,37%

CONSUMO DE ALCOHOL



58,9%

SEDENTARISMO



ANTIGRIPAL 71,4%



DOBLE - TRIPLE BACTERIANA 56,1%




ANTI NEUMO 23 57,1%



ZOSTER 3,06%



ANTINEUMO 13 60,2%



HEPATITIS B 63,5%








SARS-CoV-2 75,6%
3, 4 dosis

Variables - Visita Basal

N 111


COMORBILIDADES



DLP: dislipemia; HTA: hipertensión arterial; Enfermedad cardiovascular; enfermedad cerebrovascular; SM síndrome metabólico;

obes: obesidad; osteoporosis; esteatosis hepática; litiasis renal; FBM: fibromialgia; hipotiroidismo.

111 pacientes



75 pacientes con PS (80,6%)

EP: enfermedad psoriásica APs: artritis psoriásica PS: psoriasis

57 pacientes con APs (66,3%)


PGA: Physician's global assesment; BSA: body surface área; PASI: índice de la severidad del área de psoriasis; DLQI: dermatology life quality index




PLACAS n 64 - 65,3%



UNGUEAL n 16 - 16,3%



GOTAS n 6 - 6,12%



ERITRODÉRMICA n 3 - 3,06%



INVERTIDA n 3 - 3,06%



PUSTULOSA PALMO PLANTAR n 1 - 1,02%



PALMO PLANTAR n 1 - 1,02%

75

PACIENTES

CLINIMETRÍA

PGA (SD) 3

BSA (SD) 6,7

PASI (SD) 7,4

DLQI (SD) 7

PERIFÉRICO

- N 40
- 75,5%

INTERFALÁNGICA
DISTAL N 10 (10,2%)

OLIGOARTRITIS N 9
(9,18%)

POLIARTRITIS N 22
(22,4%)

MUTILANTE N 1
(1,02%)

ENTESITIS

- N 20
- 38,5%

AXIAL

- N 11
- 20,4%

DACTILITIS

- N 10
- 19,2%

**57
PACIENTES**


CLINIMETRÍA

**DAS 28 (SD) 3,45 (0,6%)
BASDAI (SD) 6,58 (14,7%)
HAQ-DI (SD) 0,7 (0,6%)**



UVEITIS N 3 (0,27%)

ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL
N 1 (25%)




Tratamiento de EPs

tópico n (%)	38 (45,2%)
fototerapia n (%)	12 (14,5%)
sistémico n (%)	75 (82,4)
metotrexato n (%)	60 (61,2)
leflunomida n (%)	6 (6,12)
sulfazalacina n (%)	1 (1)
acitretin n (%)	1 (1)

Tratamiento DMARD biológico ó sintético dirigido

adalimumab n (%)	20 (20,4)
certolizumab n (%)	3 (3,06)
infliximab n (%)	0
etanercept n (%)	3 (3,06)
golimumab n (%)	1 (1,02)
secukinumab n (%)	19 (19,4)
ixekizumab n (%)	2 (2,04)
guselkumab n (%)	4 (4,08)
rizankizumab n (%)	5 (5,10)
tofacitinib (%)	0
upadacitinib n (%)	3 (3,06)
apremilast n (%)	1 (1,02)
Tratamiento con fármaco en investigación n (%)	3 (3,95)



¿Quiénes pueden participar?

Todos los reumatólogos y dermatólogos,
No importa a qué sociedad médica pertenezcan.
Juntos podemos sumar datos!
renaepso@soarpso.org

¡Gracias!

